

Pflichttext

Doppelherz Glucosaminhydrochlorid 750 mg Tabletten.

Wirkstoff: Glucosaminhydrochlorid. **Zusammensetz.:** 1 Tbl. enth. 750 mg Glucosaminhydrochlorid (entsprechend 625 mg Glucosamin). **Sonst. Bestandt.:** Mikrokristalline Cellulose, Hyprolose, Hyprolose (5,0 – 16,0 % Hydroxypropoxy-Gruppen), Magnesiumstearat (Ph. Eur.) [pflanzlich]. **Anwendungsgebiet:** Linderung von Symptomen leichter bis mittelschwerer Arthrose des Kniegelenks. **Gegenanz.:** Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoffe, Schalentiere, Schwangerschaft. **Nebenwirk.:** Sofortiger Abbruch der Behandlung mit Doppelherz Glucosaminhydrochlorid 750 mg Tabletten bei Symptomen eines Angioödems z.B. Schwellung des Gesichtes, der Zunge oder des Halses, Schluckbeschwerden, Nesselausschlag und Schwierigkeiten beim Atmen. Häufig Kopfschmerzen, Müdigkeit, Übelkeit, Bauchschmerzen, Verdauungsstörungen, Durchfall, Verstopfung. Gelegentlich Ekzem, Juckreiz, Hautrötung. In nicht bekannter Häufigkeit Nesselausschlag, Schwellungen/Aanschwellen der Fußgelenke, der Beine und Füße, Schwindel, Erbrechen, Beeinträchtigung der körpereigenen Blutzuckerkontrolle bei Patienten mit Diabetes mellitus. Erhöhte Leberenzyme und Gelbsucht.

Weit. Einzelh. u. Hinw. s. Fach- und Gebrauchsinfo. Apothekenpflichtig. Queisser Pharma GmbH & Co. KG, Schleswiger Straße 74, D-24941 Flensburg. Stand 12/2018