

Pflichttext

Canesten® Extra Creme.

Wirkstoff: Bifonazol. Zusammensetzung: 1 g Creme enthält 10 mg Bifonazol. Sonstige Bestandteile: Benzylalkohol, Cetylpalmitat (Ph. Eur.), Cetylstearylalkohol (Ph. Eur.), Octyldodecanol (Ph. Eur.), Polysorbat 60, Sorbitanstearat, gereinigtes Wasser.

Anwendungsgebiete: Mykosen der Haut, verursacht durch Dermatophyten, Hefen, Schimmelpilze und andere Pilze wie *Malassezia furfur*. Dies können sein z. B. *Tinea pedis* und *Tinea manuum* sowie die Behandlung eines freigelegten Nagelbettes im Rahmen einer Nagelpilztherapie, *Tinea corporis*, *Tinea inguinalis*, *Pityriasis versicolor*, oberflächliche *Candidiasis* sowie *Erythrasma* (Erkrankung durch *Corynebacterium minutissimum*).

Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort: Schmerzen am Verabreichungsort, periphere Ödeme (am Verabreichungsort). Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes: trockene Haut, Hautirritation, Hautaufweichung, Hautabschuppung, Rötung, Brennen, Juckreiz, Ausschlag, Ekzem, Bläschen, Nesselsucht, Kontaktdermatitis, allergische Dermatitis. Diese Nebenwirkungen sind nach Beendigung der Behandlung reversibel. Bei Überempfindlichkeit gegen Cetylstearylalkohol können allergische Reaktionen an der Haut auftreten. **Warnhinweis:** Enthält Cetylstearylalkohol! **Stand: 03/2014**

Pflichttext

Canesten® Extra Spray.

Wirkstoff: Bifonazol. Zusammensetzung: 1 ml Lösung als Spray enthält 10 mg Bifonazol. Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Isopropylmyristat (Ph. Eur.). **Anwendungsgebiete:** Mykosen der Haut, verursacht durch Dermatophyten, Hefen, Schimmelpilze und andere Pilze wie *Malassezia furfur*. Dies können sein z. B. *Tinea pedis*, *Tinea manuum*, *Tinea corporis*, *Tinea inguinalis*, *Pityriasis versicolor*, oberflächliche *Candidiasis* sowie *Erythrasma* (Erkrankung durch *Corynebacterium minutissimum*).

Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort: Schmerzen am Verabreichungsort, periphere Ödeme (am Verabreichungsort). Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes: trockene Haut, Hautirritation, Hautaufweichung, Hautabschuppung, Rötung, Brennen, Juckreiz, Ausschlag, Ekzem, Bläschen, Nesselsucht, Kontaktdermatitis, allergische Dermatitis. Diese Nebenwirkungen sind nach Beendigung der Behandlung reversibel. **Warnhinweis:** Das Spray nicht in Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Die Spraylösung ist aufgrund des Ethanolgehaltes leicht entzündlich. **Stand: 03 / 2014.**

Bayer Vital GmbH, 51368 Leverkusen, Deutschland

Approval Number: L.DE.MKT.CC.07.2019.3611