

Pflichttext

Lefax®, Kautabletten mit 42 mg Simeticon, **Lefax® Extra**, Kautabletten mit 105 mg Simeticon, **Lefax® Pump-Liquid**, Suspension mit 41,2 mg/ml Simeticon. **Zusammensetzung:** *Lefax®*: 1 Kautablette enthält 42 mg Simeticon. *Lefax® Extra*: 1 Kautablette enthält 105 mg Simeticon. *Lefax® Pump-Liquid*: 1 ml (2 Pumpstöße) enthält 41,2 mg Simeticon. **Sonstige Bestandteile:** *Lefax®*: D-Glucose, Sucrose, Glycerolmonostearat, Fenchelöl, Pfefferminzöl, Kümmelöl. *Lefax® Extra*: D-Glucose, Sucrose, mikrokristalline Cellulose, Magnesiumstearat (Ph. Eur.) [pflanzlich], Hyetyllose, Fenchelöl, Pfefferminzöl, Kümmelöl. *Lefax® Pump-Liquid*: Sorbinsäure (Ph. Eur.) [E 200], Kaliumsorbit (Ph. Eur.) [E 202], Macrogol 6000, Aluminium-Magnesium-Silicat, Hyetyllose, Natriumcyclamat, Poly(oxyethylen)-25-glyceroltrioleat, Bananen-Aroma, Citronensäure, Saccharin-Natrium, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** *Lefax®*: Bei übermäßiger Gasbildung und Gasansammlung im Magen-Darm-Bereich (Meteorismus) mit gastrointestinalen Beschwerden wie Blähungen, Völlegefühl und Spannungsgefühl im Oberbauch. Bei verstärkter Gasbildung nach Operationen. Zur Vorbereitung diagnostischer Untersuchungen im Bauchbereich zur Reduzierung von Gasschatten (Sonographie, Röntgen). *Lefax® Extra*: Zur symptomatischen Behandlung von: Meteorismus, Funktioneller Dyspepsie. Zur Vorbereitung diagnostischer Untersuchungen im Bauchbereich zur Reduzierung von Gasschatten (Sonographie, Röntgen). *Lefax® Pump-Liquid*: Bei übermäßiger Gasbildung und Gasansammlung im Magen-Darm-Bereich (Meteorismus) mit gastrointestinalen Beschwerden wie Blähungen, Völlegefühl und Spannungsgefühl im Oberbauch. Zur symptomatischen Behandlung bei Säuglingskolik (3-Monats-Kolik). Bei verstärkter Gasbildung nach Operationen. Zur Vorbereitung diagnostischer Untersuchungen im Bauchbereich zur Reduzierung von Gasschatten (Sonographie, Röntgen). Als Sofortmaßnahme bei oraler Aufnahme von und Intoxikationen mit Tensiden (z.B. Flüssigseifen, Shampoos). **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit

gegen Simeticon, Pfefferminzöl (nur Kautabletten) oder einem anderen der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Überempfindlichkeitsreaktionen wie Juckreiz, Nesselsucht, Hautrötung und Angioödem. **Warnhinweise:** Lefax® und Lefax® Extra: Enthält Sucrose und Glucose (Zucker)! Lefax® Pump-Liquid: Enthält Sorbinsäure und Kaliumsorbat!

Bayer Vital GmbH, 51368 Leverkusen, Deutschland, Stand: 07/2013

Lefax® Enzym. Wirkstoffe: Simeticon und Pankreas-Pulver vom Schwein.

Zusammensetzung: 1 Kautablette enthält 41,2 mg Simeticon und 50 mg Pankreas-Pulver vom Schwein (Lipase mind. 42 Ph.Eur. E./mg, Amylase mind. 36 Ph.Eur. E./mg, Protease mind. 2 Ph.Eur. E./mg).

Sonstige Bestandteile: Sucrose (Saccharose), wasserfreie Glucose (Ph. Eur.), Glycerolmonostearat, Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer (1:1) (Ph. Eur.), Talkum, Macrogol 6000, Ananas-Aroma.

Anwendungsbereich: Traditionell angewendet als mild wirkendes Arzneimittel zur Unterstützung der Verdauungsfunktion.

Gegenanzeigen: Allergisch gegen einen der Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile. Sollte nicht eingenommen werden bei akuter Pankreatitis und akutem Schub einer chronischen Pankreatitis. **Nebenwirkungen:** In sehr seltenen Fällen kann es bei empfindlichen Patienten zu einer vorübergehenden Reizung der Mundschleimhaut führen. In Einzelfällen sind für Pankreatin allergische Reaktionen vom Soforttyp oder allergische Reaktionen des Verdauungstraktes beobachtet worden. Bei Patienten mit Mukoviszidose ist in Einzelfällen nach Gabe hoher Dosen von Pankreatin die Bildung von Darmverschlüssen beschrieben worden.

Warnhinweis: Enthält Sucrose und Glucose (Zucker). **Stand der Information:** 01/2020. Bayer Vital GmbH, 51368 Leverkusen, Deutschland