

Pflichttext

Canesten® Extra Creme

Wirkstoff: Bifonazol. Zusammensetzung: 1 g Creme enthält 10 mg Bifonazol. **Sonstige Bestandteile:** Benzylalkohol, Cetylpalmitat (Ph. Eur.), Cetylstearylalkohol (Ph. Eur.), Octyldodecanol (Ph. Eur.), Polysorbat 60, Sorbitanstearat, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Mykosen der Haut, verursacht durch Dermatophyten, Hefen, Schimmelpilze und andere Pilze wie *Malassezia furfur*. Dies können sein z. B. *Tinea pedis* und *Tinea manuum* sowie die Behandlung eines freigelegten Nagelbettes im Rahmen einer Nagelpilztherapie, *Tinea corporis*, *Tinea inguinalis*, *Pityriasis versicolor*, oberflächliche *Candidiasis* sowie *Erythrasma* (Erkrankung durch *Corynebacterium minutissimum*). **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort: Schmerzen am Verabreichungsort, periphere Ödeme (am Verabreichungsort). Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes: trockene Haut, Hautirritation, Hautaufweichung, Hautabschuppung, Rötung, Brennen, Juckreiz, Ausschlag, Ekzem, Bläschen, Nesselsucht, Kontaktdermatitis, allergische Dermatitis. Diese Nebenwirkungen sind nach Beendigung der Behandlung reversibel. Bei Überempfindlichkeit gegen Cetylstearylalkohol können allergische Reaktionen an der Haut auftreten. **Warnhinweis:** Enthält Cetylstearylalkohol! **Stand: 03 / 2014.**

Pflichttext

Canesten® Extra Spray

Wirkstoff: Bifonazol. **Zusammensetzung:** 1 ml Lösung als Spray enthält 10 mg Bifonazol. **Sonstige Bestandteile:** Ethanol 96 %, Isopropylmyristat (Ph. Eur.). **Anwendungsgebiete:** Mykosen der Haut, verursacht durch Dermatophyten, Hefen, Schimmelpilze und andere Pilze wie *Malassezia furfur*. Dies können sein z. B. *Tinea pedis*, *Tinea manuum*, *Tinea corporis*, *Tinea inguinalis*, *Pityriasis versicolor*, oberflächliche *Candidiasis* sowie *Erythrasma* (Erkrankung durch *Corynebacterium minutissimum*). **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort: Schmerzen am Verabreichungsort, periphere Ödeme (am Verabreichungsort). Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes: trockene Haut, Hautirritation, Hautaufweichung, Hautabschuppung, Rötung, Brennen, Juckreiz, Ausschlag, Ekzem, Bläschen, Nesselsucht, Kontaktdermatitis, allergische Dermatitis. Diese Nebenwirkungen sind nach Beendigung der Behandlung reversibel. **Warnhinweis:** Das Spray nicht in Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Die Spraylösung ist aufgrund des Ethanolgehaltes leicht entzündlich. **Stand: 03 / 2014.**

Pflichttext

Canesten® Creme und Spray

Wirkstoff: Clotrimazol

Anwendungsgebiete: Zur Behandlung von Pilzerkrankungen (Mykosen) der Haut (bei Creme zusätzlich: und Schleimhaut), verursacht durch Dermatophyten, Hefen, Schimmelpilze und andere, wie *Malassezia furfur*, sowie Hautinfektionen durch *Corynebacterium minutissimum*.

Hinweis für Creme: Enthält Cetylstearylalkohol. Bitte Packungsbeilage beachten.

Hinweis für Spray: Enthält Propylenglycol. Bitte Packungsbeilage beachten.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Pflichttext

Canesten® Extra Nagelset.

Wirkstoffe: Bifonazol / Harnstoff. **Zusammensetzung:** 1 g Salbe enthält 10 mg Bifonazol und 400 mg Harnstoff. **Sonstige Bestandteile:** Wollwachs, gebleichtes Wachs, weißes Vaseline.

Anwendungsgebiete: Zur nagelablösenden Behandlung bei Pilzinfektionen der Nägel an Händen und Füßen mit gleichzeitiger antimykotischer Wirkung. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Folgende **Nebenwirkungen** wurden im Nagelbereich (Nagel, Nagelrand, Nagelbett) nach Anwendung von Canesten Extra Nagelset beobachtet: Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes: Hautirritation, Kontaktdermatitis, Mazeration, Hautabschuppung, Nagelfehlbildungen, Nagelverfärbungen, Erythem, Pruritus, Exanthem, Schmerzen am Verabreichungsort, Schmerzen in den Extremitäten. Diese Nebenwirkungen sind nach Beendigung der Behandlung reversibel. **Warnhinweis:** Enthält Wollwachs! **Stand: 06/2015**

Bayer Vital GmbH, 51368 Leverkusen, Deutschland

Approval Number: L.DE.MKT.CC.07.2019.3611