

Pflichttexte

Canesten® Extra Nagelset. Wirkstoffe: Bifonazol / Harnstoff.
Zusammensetzung: 1 g Salbe enthält 10 mg Bifonazol und 400 mg Harnstoff. **Sonstige Bestandteile:** Wollwachs, gebleichtes Wachs, weißes Vaseline. **Anwendungsgebiete:** Zur nagelablösenden Behandlung bei Pilzinfektionen der Nägel an Händen und Füßen mit gleichzeitiger antimykotischer Wirkung. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Folgende **Nebenwirkungen** wurden im Nagelbereich (Nagel, Nagelrand, Nagelbett) nach Anwendung von Canesten Extra Nagelset beobachtet: Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes: Hautirritation, Kontaktdermatitis, Mazeration, Hautabschuppung, Nagelfehlbildungen, Nagelverfärbungen, Erythem, Pruritus, Exanthem, Schmerzen am Verabreichungsort, Schmerzen in den Extremitäten. Diese Nebenwirkungen sind nach Beendigung der Behandlung reversibel. **Warnhinweis:** Enthält Wollwachs! **Stand: 06/2015**

Pflichttexte

Canesten® Extra Creme. Wirkstoff: Bifonazol.
Zusammensetzung: 1 g Creme enthält 10 mg Bifonazol.
Sonstige Bestandteile: Benzylalkohol, Cetylpalmitat (Ph. Eur.), Cetylstearylalkohol (Ph. Eur.), Octyldodecanol (Ph. Eur.), Polysorbat 60, Sorbitanstearat, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Mykosen der Haut, verursacht durch Dermatophyten, Hefen, Schimmelpilze und andere Pilze wie *Malassezia furfur*. Dies können sein z. B. *Tinea pedis* und *Tinea manuum* sowie die Behandlung eines freigelegten Nagelbettes im Rahmen einer Nagelpilztherapie, *Tinea corporis*, *Tinea inguinalis*, *Pityriasis versicolor*, oberflächliche Candidiasis sowie Erythrasma (Erkrankung durch *Corynebacterium minutissimum*).
Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort: Schmerzen am Verabreichungsort, periphere Ödeme (am Verabreichungsort). Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes: trockene Haut, Hautirritation, Hautaufweichung, Hautabschuppung, Rötung, Brennen, Juckreiz, Ausschlag, Ekzem, Bläschen, Nesselsucht, Kontaktdermatitis, allergische Dermatitis. Diese Nebenwirkungen sind nach Beendigung der Behandlung reversibel. Bei Überempfindlichkeit gegen Cetylstearylalkohol können allergische Reaktionen an der Haut auftreten.
Warnhinweis: Enthält Cetylstearylalkohol! **Stand: 03/2014**

Bayer Vital GmbH, 51368 Leverkusen, Deutschland

Approval Number: L.DE.MKT.CC.07.2019.3611