PFLICHTTEXT

Finalgon Wärmesalbe DUO 4 mg/g + 25 mg/g Salbe.
Wirkst.: Nonivamid u. Nicoboxil. **Zusammens.:** 1 g Salbe enthält: *Arzneil. wirks. Bestandt.:* 4 mg Nonivamid und 25 mg Nicoboxil. *Sonst. Bestandt.*: Diisopropyladipat, Hochdisperses Siliciumdioxid, Weißes Vaselin, Sorbinsäure (Ph. Eur.), Citronellöl (enthält 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-on, Amylcinnamal, Amylcinnamylalkohol, Anisylalkohol, Benzylalkohol, Benzylbenzoat, Benzylcinnamat, Benzyl-salicylat, Zimtaldehyd, Cinnamylalkohol, Citral, Citronellol, Cumarin, d-Limonen, Eugenol, Farnesol, Geraniol, Hexylcinnamaldehyd, Hydroxycitronellal, Hydroxymethylpentyl-cyclohexencarboxaldehyd, Isoeugenol, Lilial, Linalool, Methylheptincarbonat, Eichenmoos, Baummoos), Gereinigtes Wasser. **Anw.-geb.:** Zur Förderung der Hautdurchblutung bei Muskel- und Gelenkbeschwerden. Zur Behandlung von akuten Schmerzen im unteren Rückenbereich ohne Anzeichen eines neuropathischen Ursprungs. Zur Förderung der Hautdurchblutung vor der kapillaren Blutentnahme, z. B. aus dem Ohrläppchen oder der Fingerkuppe. **Gegenanz.:** Überempfindlichkeit gegen Nonivamid, Nicoboxil, Allergene im Duftstoff (3-Methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-on, Amylcinnamal, Amylcinnamylalkohol, Anisylalkohol, Benzylalkohol, Benzylbenzoat, Benzylcinnamat, Benzylsalicylat, Zimtaldehyd, Cinnamylalkohol, Citral, Citronellol, Cumarin, d-Limonen, Eugenol, Farnesol, Geraniol, Hexylcinnamaldehyd, Hydroxycitronellal, Hydroxymethylpentyl-cyclohexencarboxaldehyd, Isoeugenol, Lilial, Linalool, Methylheptincarbonat, Eichenmoos, Baummoos) oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile. Sehr empfindliche Haut. Offene Wunden. Dermatitis. Erkrankte Hautstellen. **Warnhinw.:** Enthält Sorbinsäure und einen Duftstoff mit Allergenen (3-Methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-on, Amylcinnamal, Amylcinnamylalkohol, Anisylalkohol, Benzylalkohol, Benzyl-benzoat, Benzylcinnamat, Benzylsalicylat, Zimtaldehyd, Cinnamylalkohol, Citral, Citronellol, Cumarin, d-Limonen, Eugenol, Farnesol, Geraniol, Hexylcinnamaldehyd, Hydroxycitronellal, Hydroxymethylpentyl-cyclohexencarboxaldehyd, Isoeugenol, Lilial, Linalool, Methylheptincarbonat, Eichenmoos, Baummoos). Packungsbeilage beachten. Nicht anwenden bei sehr empfindlicher Haut, offenen Wunden, entzündeter oder erkrankter Haut. Bitte entnehmen Sie die genaue Dosisempfehlung der Packungsbeilage. Nicht im Gesicht, den Augen oder am Mund anwenden! Nach jeder Anwendung die Hände waschen. **Nebenw.:** Die folgenden Nebenwirkungen basieren auf Beobachtungen nach der Markteinführung sowie Datensätzen von 202 Patienten aus klinischen Studien, die mit einer Salbe, die 0,4 % Nonivamid und 2,5 % Nicoboxil enthielt, behandelt wurden. E*rkrankungen des Immunsystems:* Nicht bekannt: Anaphylaktische Reaktionen, Überempfindlichkeitsreaktionen. *Erkrankungen des Nervensystems:* Häufig: Brennendes Gefühl auf der Haut. Nicht bekannt: Parästhesie. *Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und Mediastinums:* Nicht bekannt: Husten, Dyspnoe. *Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes:* Häufig: Erythem, Pruritus. Gelegentlich: Ausschlag. Nicht bekannt: Pusteln an der Anwendungsstelle, lokale Hautreaktionen, Blasen, schwellendes Gesicht, Urtikaria. **Hinweise in der Fachinformation beachten. Apothekenpflichtig.**
Pharmazeutischer Unternehmer: **Zentiva Pharma GmbH,** Brüningstraße 50, 65926 Germany
Stand: März 2023